



EPOC: ¿COMO MEJORAR LA CAPTACION Y EL DIAGNOSTICO EN ATENCION PRIMARIA?

Lueza Lampurlanes C, Torres Clemente E, Bailac Costa J, Aullé Ciutat M, Ibáñez Castellar L, Chaverri Alamán C.
 Centro de Salud Binefar.Sector Barbastro.Servicio Aragonés de Salud

La EPOC es la primera causa de muerte evitable (SEPAR).
 Detectamos un infradiagnostico en atención primaria debido al poco uso del espirómetro, a la dificultad en la realización y a su interpretación.
 Detectamos baja cobertura en deshabituación tabáquica.



OBJETIVO:

Aumentar la cobertura de EPOC.
 Diagnostico precoz en esta patología.
 Intervención sobre el abandono del habito tabáquico.
 Seguimiento y tratamiento adecuado,
 Aumentar vacunación antigripal y antineumococica

MATERIAL Y METODOS


Técnica correcta en la realización de espirimetrías.
 Agenda específica en admisión. para realización de espirimetrías.
 2 días a la semana 2 horas. Por dos profesionales adiestrados de enfermería.
 5 espirimetrías/semana por 40 semanas= 200espirometrías/año.
 Interpretación adecuada de resultados.

RESULTADOS:

Se adquirió un espirómetro, SPIROLAB II. En marzo de 2009.
 Se formó en el servicio de neumología del hospital, todos los profesionales de enfermería.
 Se formó a los profesionales de medicina, en el Centro de Salud, para interpretación de espirimetrías.
 Proyección audiovisual sobre educación a pacientes EPOC.

EVALUACIÓN DE INDICADORES:

- Nº pacientes EPOC fumadores con consejo antitabaco.(objetivo 100%)= 100%
- Nº pacientes EPOC vacunados de la gripe.(objetivo 90%)
- Nº pacientes en cartera de servicios EPOC/ Nº de casos esperados(67/480)(objetivo 80%)
- Nº de espirimetrías realizadas año/ 100 espirimetrías. (objetivo 80%) = 56/80=70%
- Nº pacientes en cartera de servicios en deshabituación tabáquica/Nº de casos esperados (3390) (objetivo 80%)



CONCLUSIONES:

Dificultades encontradas:

Avería en dos ocasiones del espirómetro a lo largo de este año.
 Retraso en la creación de la agenda en OMI específica de espirimetrías (salas). Esto provoca perdida de información.
 Desconocimiento de lista de espera. (análisis de profesionales)

- LA EPOC es la enfermedad crónica mas prevalente en atención primaria.
- Observamos un discreto aumento en las coberturas de EPOC y deshabituación tabáquica.
- Buena cobertura en vacunación antigripal
- Seguimos con dificultades en el diagnostico de la EPOC, porque no se realizan las Espirometrías necesarias, Esto provoca una baja cobertura para realizar el seguimiento adecuado.
- Aumentar la intervención en diagnostico precoz.(GOLD-SEPAR-ALAT)

