COMPLICACIONES

- Comunique al personal de enfermería si existe :
  - Dolor.
  - Picor.
  - Signos de infección, como enrojecimiento o fiebre.
  - Sangrado: PINZAR EL CATETER Y ACUDIR A URGENCIAS



CONSEJOS

ADVIERTA al personal sanitario que es portador de catéter y que este **NO DEBE SER UTILIZADO PARA OTRO PROCEDIMIENTO** que no sea la hemodiálisis.



salud
servicio aragonés de salud

HOSPITAL DE BARBASTRO

SERVICIO DE HEMODIÁLISIS

HORARIO: de 8 a 20 h, de lunes a sábado.

974 249 000

EXTENSIÓN: 29295

CATÉTER CENTRAL

INTRODUCCIÓN

El catéter es un acceso vascular de elección a la hora de abordar el tratamiento de hemodiálisis.

¿QUE ES?¿PARA QUÉ SIRVE?

Dispositivo en forma de tubo colocado en una vena de gran flujo, situado en la zona del tórax.

Dispone de dos ramas: por una sale la sangre del cuerpo hacia la máquina de diálisis y por la otra entra al cuerpo ya limpia.

¿DÓNDE SE COLOCA?

Se coloca en quirófano bajo anestesia local.

CUIDADOS

Tras la colocación puede haber inflamación y dolor en la zona debido al procedimiento. **Si existe sangrado** debe **comunicarlo** a la unidad.

No utilice maquinillas de afeitar, tijeras ni **objetos cortantes** cerca de la zona.

Evitar golpes o tirones.

No intente **desprenderse del apósito.** Si se despega, refuércelo con esparadrapo.

Procure llevar **ropa holgada y cómoda**.

Mantenga una buena **higiene** personal. El apósito debe estar limpio y seco: **puede ducharse** protegiendo dicha zona con un **apósito impermeable.**