

HOSPITAL DE BARBASTRO Y CENTRO DE ESPECIALIDADES DE MONZÓN

INFORMACIÓN AL PACIENTE SOBRE TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE

SERVICIO DE HEMATOLOGÍA SECCIÓN HEMOSTASIA

Consulta de Hemostasia
Hospital de Barbastro
974 249000 ext. 29459

Centro de Especialidades
de Monzón
974 415850



¿POR QUÉ TOMO ANTICOAGULANTES?


Algunas enfermedades o circunstancias hacen que la sangre se acumule en las cavidades del corazón, en las arterias ó en las venas, produciéndose la formación de coágulos “trombos”.

Si un coágulo se desprende puede taponar una arteria produciéndose una embolia.

Los anticoagulantes sirven para prevenir las trombosis y / o embolias.

¿QUIÉN DEBE TOMAR ANTICOAGULANTES?

Los pacientes que padecen enfermedades de corazón, factores congénitos o adquiridos de la sangre que predisponen a “trombos” o que las hayan padecido



COMO TOMAR EL ANTICOAGULANTE

Los anticoagulantes son fármacos que se administran por vía oral en comprimidos, que se pueden fraccionar.

Tome la dosis según le indica la hoja de control y no interrumpa el tratamiento sin consultar.

Tómelo siempre a la misma hora para crear hábito y si se olvida puede tomarlo a lo largo del día. Nunca debe añadirlo a la dosis del día siguiente.

Si toma por error mas de la dosis indicada, deberá consultar.

No debe automedicarse. No tome aspirinas o fármacos similares.

Avise siempre que está tomando anticoagulantes.

PRECAUCIONES

Siempre que acuda a una visita médica, debe avisar que está tomando anticoagulantes.

No deben administrarle inyecciones intramusculares. En caso necesario consultar. Puede realizarse cualquier vacunación.

El día que acuda al control, deberá comunicar las incidencias ocurridas desde la última visita: cambios de medicación, problemas médicos nuevos, cambio de dieta, necesidad de intervención quirúrgica, pruebas diagnósticas, dentistas, etc.

Adelantará su control si tiene vómitos ó diarreas más de dos días seguidos

Si sospecha que está embarazada, póngase en contacto con la consulta de hemostasia

Si presenta pérdidas anormales de sangre por: encías, nariz, orina, heces o hematomas, consúltenos.

Si la hemorragia es abundante debe suspender el tratamiento anticoagulante y debe acudir a un servicio de urgencias